



DO NOT USE FOR INDICATIONS OR APPLICATIONS THAT ARE NOT SPECIFICALLY NOTED IN THE INSTRUCTIONS FOR USE

INTENDED USE
Mucosamin® Spray is a medical device which conforms to EU Directive 93/42/EEC and has a predominantly protective action on the oral mucosa. The product contains hyaluronic acid, a key component of connective tissue, and amino acids aimed to promote the formation of collagen. The protective action of the ingredients is intended to help the process of regeneration of the oral mucosa in order to promote the rapid healing of areas of ulceration, resulting in a corresponding reduction in pain. The special spray formulation allows easy application to difficult to reach areas of the mouth. Mucosamin® Spray is indicated in the treatment of mucositis due to radiotherapy or chemotherapy.

DESCRIPTION
Mucosamin® Spray is a fluid gel used to hydrate the oral mucosa, on which it exerts a protective effect. It helps to alleviate the irritation of the oral cavity that has been caused by mucositis. Mucosamin® Spray also aids the process of repair of damaged mucosal tissues of the oral cavity, helping to reduce local sensitivity within the mouth while at the same time promoting maintenance and restoration of normal physiological conditions.

COMPOSITION
Purified Water, Sodium Hyaluronate, Glycine, L-Proline, L-Leucine, L-Lysine HCl, Sodium Methyl Parahydroxybenzoate, Sodium Propyl Parahydroxybenzoate, Propylene Glycol, Tetrasodium EDTA.

PACKAGING
30 ml glass bottle with spray nozzle.

MODE OF ACTION
Oral mucositis caused by radiotherapy or chemotherapy is a common side effect in patients with cancer. The damage of mucosa develops with an initiation phase followed by a phase of damage amplification: the outcome is a phase of ulceration followed by a phase of tissue repair. Lesions of the oral cavity are characterised by erythema and recurrent ulcers of the mucosa with burning pain of varying severity. Severe forms of mucositis have a heavy impact on quality of life and may compromise the ability of a patient to tolerate the scheduled therapeutic treatment plan. Mucosamin® Spray, by creating a protective layer, acts on the ulcerative phase of mucositis and promotes a faster reduction of pain and burning. Hyaluronic acid and amino acids act in the regeneration phase of mucositis and promote repair of oral mucosa.

INSTRUCTIONS FOR USE
After cleaning the oral cavity as described in the section on "precautions" below, apply a uniform layer of the product to the whole oral cavity, concentrating on the damaged area. Direct the tip of the device onto the damaged areas and spray repeatedly until the entire area is covered. It is advisable to combine the use of Mucosamin® Spray with a diet free from acidic or spicy foods.



NE PAS UTILISER POUR DES APPLICATIONS AUTRES QUE CELLES INDiquÉES DANS LA NOTICE D'ILLUSTRATION

PRECAUTIONS FOR USE
Before treatment, remove any foreign matter from the ulcerated area by rinsing or gently cleaning with gauze. After cleaning of the area, spray the product on the area to be treated. Do not stop using any antifungal therapies that have been prescribed. It is advisable to eliminate the remainder of the product from the spray nozzle by cleaning with a wet gauze after each application.

CONTRAINDICATIONS
Contraindicated in the event of known hypersensitivity to the ingredients. There have been no reports of overdose. There have been no reports of side effects. There have been no reports of interactions with drugs or medicinal substances.

Although there are no known secondary effects during pregnancy and breastfeeding, it is left to the physician to decide whether prescribing is appropriate. Mucosamin® Spray is generally well tolerated.

WARNINGS
• Expire refers to product that is sealed and properly stored.
• Do not use after the expiry date.
• Do not sterilise.
• Do not use if the packaging has been opened or damaged.
• Do not use in the event of known hypersensitivity to any of the ingredients.
• Keep out of reach of children.
• In the event of adverse reactions, stop using the treatment and consult a physician.

DOSAGE AND ADMINISTRATION
Apply a uniform layer by repeatedly spraying until the entire affected area is covered, three or four times a day according to the severity of the symptoms.

DISPOSAL
Please dispose of carefully.

STORAGE
Mucosamin® Spray should be stored between 8 °C and 30 °C. Do not keep in the refrigerator. Store in a cool dry place, away from damp and sources of heat.

MANUFACTURER
Professional Dietetics S.p.A.
Via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milan – Italy

INSTRUCTIONS FOR USE
After cleaning the oral cavity as described in the section on "precautions" below, apply a uniform layer of the product to the whole oral cavity, concentrating on the damaged area. Direct the tip of the device onto the damaged areas and spray repeatedly until the entire area is covered. It is advisable to combine the use of Mucosamin® Spray with a diet free from acidic or spicy foods.

INSTRUCTIONS FOR USE
Après avoir nettoyé la cavité buccale comme cela est décrit dans le paragraphe suivant « précautions », appliquer une couche uniforme sur toute la cavité buccale et sur la zone de lésion.



DAS PRODUKT DARF NUR ZU DEN IN DIESER GEBRAUCHSINFORMATION ANGEgebenEN ZWECKEN VERWENDET WERDEN

VERWENDUNGSZWECK
Mucosamin® Spray ist ein Medizinprodukt im Sinne der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte, das in erster Linie zum Schutz der Mundschleimhaut dient. Das Produkt enthält Hyaluronsäure, den Hauptbestandteil des Bindegewebes, sowie Aminosäuren zur Förderung der Kollagenbildung. Durch die schützende Wirkung seiner Inhaltsstoffe unterstützt Mucosamin® den Regenerationsprozess der Mundschleimhaut, fördert die rasche Heilung der ulzerierten Bereiche und wirkt gleichzeitig schmerzlindernd. Dank der Darreichungsform als Spray lässt sich Mucosamin® auch leicht auf schwer erreichbare Stellen der Mundhöhle auftragen. Mucosamin® ist indiziert bei Schleimhautentzündungen im Zusammenhang mit Chemotherapie, Strahlentherapie sowie kombinierten oder begleitenden Behandlungen.

PRECAUTIONS D'UTILISATION
Avant le traitement, éloigner de la zone ulcérée l'éventuel matériel étranger en faisant des bains de bouche ou en la lavant délicatement avec une gaze. Après avoir nettoyé la zone à traiter, pulvériser le produit. Ne pas suspendre les éventuelles thérapies antifongiques prescrites. Le produit n'a pas tendance à obstruer la canule, mais il convient néanmoins d'éloigner les résidus de produit de l'applicateur en le nettoyant avec une gaze humide après chaque utilisation.

CONTRAINDICATIONS
Contre-indiqué en cas d'hypersensibilité certifiée à un des composants. Aucun phénomène de surdosage n'est reconnu. Aucun effet collatéral n'est connu.

Aucune interaction avec des médicaments et des substances médicinales n'est connue. Même si aucun effet secondaire n'est connu, en cas de grossesse et d'allaitement, il revient au médecin de décider s'il convient d'en prescrire l'application. Le spray Mucosamin® est un produit caractérisé par une bonne tolérance.

COMPOSITION
Eau épurée, hyaluronate de sodium, glycine, L-proline, L-leucine, chlorhydrate de L-lysine, 4-hydroxybenzoate de méthyle sel sodique, 4-hydroxybenzoate de propyle sel sodique, propylène glycol, EDTA tétrasodique.

CONDITIONNEMENT
Flacon en verre avec canule – Spray 30 ml.

MODE D'ACTION
La muque buccale induite par la radiothérapie ou la chimiothérapie est un effet collatéral fréquent chez les patients ayant un cancer. L'inflammation au niveau de la muqueuse se développe à travers une phase d'initiation suivie d'une phase d'amplification de l'inflammation: le résultat est une phase d'ulcération suivie dans des délais variables d'une phase de réparation du tissu. La muque buccale est caractérisée par un érythème et des ulcères récurrents de la muqueuse avec une douleur cuisante plus ou moins grave.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION
Appliquer une couche uniforme en pulvérisant le produit à plusieurs reprises jusqu'à ce que toute la zone concernée soit recouverte. L'application peut être répétée à plusieurs reprises durant la journée (trois à quatre fois) en fonction de l'entité de la symptomatologie.

MODE D'ELIMINATION DU PRODUIT
Ne pas jeter dans l'environnement.

MODE DE CONSERVATION
Le spray Mucosamin® doit être conservé à une température comprise entre 8 °C et 30 °C. Ne pas conserver au frigo. Conserver dans un lieu frais et sec, à l'abri de l'humidité et de sources de chaleur.

FABRICANT
Professional Dietetics S.p.A.
Via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milan – Italy



NO UTILIZAR PARA APLICACIONES DIFERENTES DE LAS INDICADAS EN EL PROSPECTO

USO PREVISTO
Mucosamin® spray es un producto sanitario de acción principalmente protectora de las mucosas orales, realizado de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE MDD. El producto contiene ácido hialurónico, componente principal del tejido conjuntivo, y aminoácidos destinados a favorecer la formación del colágeno.

PRECAUCIONES DE USO
Antes del tratamiento, retirar de la zona ulcerada el material extraño que pudiera haber mediante enjuagues y lavado delicado con gasa. Después de haber limpiado la zona a tratar, rociar el producto. No suspender las posibles terapias anti-micóticas prescritas. El producto no tiende a obstruir el pulverizador, pero sin embargo es una buena medida alejar residuos de producto de la aplicación mediante lavado con gasa húmeda después de cada uso.

CONTRAINDICACIONES
Contraindicado en caso de comprobada hipersensibilidad a los componentes.

No se conocen fenómenos de sobredosis.

No se conocen efectos colaterales.

No se conocen interacciones con fármacos y sustancias medicamentosas.

Si bien no se conocen efectos secundarios en caso de embarazo y lactancia, el médico debe decidir si resulta oportuno prescribir la aplicación.

Mucosamin® spray es un producto caracterizado por una buena tolerabilidad.

COMPOSICIÓN
Agua depurada, hialuronato de sodio, Glicina, L-Prolina, L-Leucina, L-lisina clorhidrato, Metil 4 - hidroxibenzoato sal sódica, Propil 4 - hidroxibenzoato sal sódica, Propilenglicol, EDTA Tetrasódico.

ENVASADO
Frasco de cristal con pulverizador de cánula – Espray 30 ml.

MODO DE ACCIÓN
La mucositis oral inducida por la radioterapia o la quimioterapia es un efecto colateral frecuente en pacientes afectados de cáncer.

El daño de la mucosa se desarrolla a través de una fase de iniciación seguida de una fase de ampliación del daño: el resultado es una fase de ulceración seguida, con tiempos variables, de una fase de reparación del tejido. La mucosidad oral se caracteriza por eritemas y úlceras recurrentes de la mucosa con dolor urente de diversa gravedad. Formas de mucositis graves tienen un fuerte impacto sobre la calidad de vida y pueden poner en peligro la capacidad de tolerar el plan terapéutico programado. Mucosamin® espray, creando un estrato protector, actúa sobre la fase ulcerosa de la mucositis y favorece una más rápida reducción del dolor y del ardor.

El ácido hialurónico y los aminoácidos entran asimismo en acción en la fase regenerativa de la mucositis y favorecen la reparación de la mucosa oral.

INDICACIONES DE USO
Después de haber lavado la boca como se describe en la zona das lesões. Dirigir a ponta do aplicador para o lado uniforme por toda la cavidad oral y en la zona de la lesión. Dirigir la punta del aplicador hacia las zonas de ulceración o, en cualquier caso, urentes y rociar varias veces hasta

USO PREVISTO
Mucosamin® spray es un producto sanitario de acción principalmente protectora de las mucosas orales, realizado de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE MDD. El producto contiene ácido hialurónico, componente principal del tejido conjuntivo, y aminoácidos destinados a favorecer la formación del colágeno.

PRECAUCIONES DE USO
Antes del tratamiento, retirar de la zona ulcerada el material extraño que pudiera haber mediante enjuagues y lavado delicado con gasa. Después de haber limpiado la zona a tratar, rociar el producto. No suspender las posibles terapias anti-micóticas prescritas. El producto no tiende a obstruir el pulverizador, pero sin embargo es una buena medida alejar residuos de producto de la aplicación mediante lavado con gasa húmeda después de cada uso.

CONTRAINDICACIONES
Contraindicado en caso de comprobada hipersensibilidad a los componentes.

No se conocen fenómenos de sobredosis.

No se conocen efectos colaterales.

No se conocen interacciones con fármacos y sustancias medicamentosas.

Si bien no se conocen efectos secundarios en caso de embarazo y lactancia, el médico debe decidir si resulta oportuno prescribir la aplicación.

Mucosamin® spray es un producto caracterizado por una buena tolerabilidad.

COMPOSICIÓN
Agua depurada, hialuronato de sodio, Glicina, L-Prolina, L-Leucina, L-lisina clorhidrato, Metil 4 - hidroxibenzoato sal sódica, Propil 4 - hidroxibenzoato sal sódica, Propilenglicol, EDTA Tetrasódico.

ENVASADO
Frasco de cristal con pulverizador de cánula – Espray 30 ml.



NÃO UTILIZAR PARA APLICACOES DIFERENTES DAS INDICADAS NO FOLHETO EXPLICATIVO

USO PREVISTO
Mucosamin® spray é um dispositivo médico de ação predominantemente protetora das mucosas bucais, produzido em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE MDD. O produto contém ácido hialurónico, componente principal do tecido conjuntivo, e aminoácidos destinados a favorecer a formação do colágeno.

PRECAUCOES DE USO
Antes do tratamento, retirar de la zona ulcerada el material extraño que pudiera haber mediante enjuagues y lavado delicado con gasa. Después de haber limpiado la zona a tratar, rociar el producto. No suspender las posibles terapias anti-micóticas prescritas. El producto no tiende a obstruir el pulverizador, pero sin embargo es una buena medida alejar residuos de producto de la aplicación mediante lavado con gasa húmeda después de cada uso.

CONTRAINDICACOES
É contraindicado no caso de hipersensibilidade observada face aos componentes.

Não são conhecidos fenómenos de sobredosagem.

Não são conhecidos efeitos colaterais.

Não são conhecidas interações com fármacos e produtos medicinais.

Embora não sejam conhecidos efeitos secundários em caso de gravidez e aleitamento, cabe ao médico avaliar a oportunidade de prescrever a aplicação.

Mucosamin® spray é um produto que se caracteriza pela sua boa tolerabilidade.

DESCRICÇÃO
É um gel fluido que se utiliza para hidratar as mucosas orais sobre las que ejerce una acción protectora. Alivia los estados irritativos de la cavidad oral, normalmente causados por mucosis.

Reduce la sensibilidad a los ataques externos contribuyendo al proceso de reparación de los tejidos de la boca, favoreciendo al mismo tiempo el mantenimiento y el restablecimiento de las condiciones fisiológicas.

COMPOSICIÓN
Agua depurada, hialuronato de sodio, Glicina, L-Prolina, L-Leucina, L-lisina clorhidrato, Metil 4 - hidroxibenzoato sal sódica, Propil 4 - hidroxibenzoato sal sódica, Propilenglicol, EDTA Tetrasódico.

EMBALAGEM
Frasco de vidro com dispensador de cánula – spray 30 ml.

MODO DE ATUAÇÃO
A mucosite oral induzida pela radioterapia ou quimioterapia é um efeito colateral frequente em pacientes atacados pelo cancro. O dano da mucosa desenvolve-se através de uma fase de iniciação seguida por uma fase de amplificação do dano: o resultado é uma fase de ulceração seguida, em tempos variáveis, por uma fase de reparação do tecido. A mucosite oral caracteriza-se por eritema e úlceras recorrentes da mucosa com dores ardentes de intensidade variável. Formas graves de mucosite têm um impacto significativo na qualidade de vida e podem comprometer a capacidade de tolerar o plano terapêutico programado. Mucosamin® spray, criando uma camada protetora, atua sobre a fase ulcerativa da mucosite e favorece uma redução mais rápida da dor e da ardência.

O ácido hialurónico e os aminoácidos entram assim em ação na fase regeneradora da mucosite e favorecem a reparação da mucosa bucal.

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Depois de ter lavado a cavidade bucal conforme se descreve na secção "precauções" que se segue, aplicar uma camada uniforme em toda a cavidade bucal e na zona das lesões. Dirigir a ponta do aplicador para o lado uniforme por toda a cavidade oral e na zona de la lesión. Dirigir la punta del aplicador hacia las zonas de ulceración o, en cualquier caso, urentes y rociar varias veces hasta

USO PREVISTO
Mucosamin® spray es un producto sanitario de acción principalmente protectora de las mucosas orales, realizado de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE MDD. El producto contiene ácido hialurónico, componente principal del tejido conjuntivo, y aminoácidos destinados a favorecer la formación del colágeno.

PRECAUCIONES DE USO
Antes del tratamiento, retirar de la zona ulcerada el material extraño que pudiera haber mediante enjuagues y lavado delicado con gasa. Después de haber limpiado la zona a tratar, rociar el producto. No suspender las posibles terapias anti-micóticas prescritas. El producto no tiende a obstruir el pulverizador, pero sin embargo es una buena medida alejar residuos de producto de la aplicación mediante lavado con gasa húmeda después de cada uso.

CONTRAINDICACIONES
Contraindicado en caso de comprobada hipersensibilidad a los componentes.

No se conocen fenómenos de sobredosis.

No se conocen efectos colaterales.

No se conocen interacciones con fármacos y sustancias medicamentosas.

Si bien no se conocen efectos secundarios en caso de embarazo y lactancia, el médico debe decidir si resulta oportuno prescribir la aplicación.

Mucosamin® spray es un producto caracterizado por una buena tolerabilidad.

COMPOSICIÓN
Agua depurada, hialuronato de sodio, Glicina, L-Prolina, L-Leucina, L-lisina clorhidrato, Metil 4 - hidroxibenzoato sal sódica, Propil 4 - hidroxibenzoato sal sódica, Propilenglicol, EDTA Tetrasódico.

ENVASADO
Frasco de cristal con pulverizador de cánula – Espray 30 ml.

MODO DE ACCIÓN
La mucositis oral inducida por la radioterapia o la quimioterapia es un efecto colateral frecuente en pacientes afectados de cáncer.

El daño de la mucosa se desarrolla a través de una fase de iniciación seguida de una fase de ampliación del daño: el resultado es una fase de ulceración seguida, con tiempos variables, de una fase de reparación del tejido. La mucosidad oral se caracteriza por eritemas y úlceras recurrentes de la mucosa con dolor urente de diversa gravedad. Formas de mucositis graves tienen un fuerte impacto sobre la calidad de vida y pueden poner en peligro la capacidad de tolerar el plan terapéutico programado. Mucosamin® espray, creando un estrato protector, actúa sobre la fase ulcerosa de la mucositis y favorece una más rápida reducción del dolor y del ardor.

El ácido hialurónico y los aminoácidos entran después en acción en la fase regenerativa de la mucositis y favorecen la reparación de la mucosa oral.

INDICACIONES DE USO
Después de haber lavado la boca como se describe en la zona das lesões. Dirigir a ponta do aplicador para o lado uniforme por toda la cavidad oral y en la zona de la lesión. Dirigir la punta del aplicador hacia las zonas de ulceración o, en cualquier caso, urentes y rociar varias veces hasta

USO PREVISTO
Mucosamin® spray es un producto sanitario de acción principalmente protectora de las mucosas orales, realizado de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE MDD. El producto contiene ácido hialurónico, componente principal del tejido conjuntivo, y aminoácidos destinados a favorecer la formación del colágeno.

PRECAUCIONES DE USO
Antes del tratamiento, retirar de la zona ulcerada el material extraño que pudiera haber mediante enjuagues y lavado delicado con gasa. Después de haber limpiado la zona a tratar, rociar el producto. No suspender las posibles terapias anti-micóticas prescritas. El producto no tiende a obstruir el pulverizador, pero sin embargo es una buena medida alejar residuos de producto de la aplicación mediante lavado con gasa húmeda después de cada uso.

CONTRAINDICACIONES
Contraindicado en caso de comprobada hipersensibilidad a los componentes.

No se conocen fenómenos de sobredosis.

No se conocen efectos colaterales.

No se conocen interacciones con fármacos y sustancias medicamentosas.

Si bien no se conocen efectos secundarios en caso de embarazo y lactancia, el médico debe decidir si resulta oportuno prescribir la aplicación.

Mucosamin® spray es un producto caracterizado por una buena tolerabilidad.

COMPOSICIÓN
Agua depurada, hialuronato de sodio, Glicina, L-Prolina, L-Leucina, L-lisina clorhidrato, Metil 4 - hidroxibenzoato sal sódica, Propil 4 - hidroxibenzoato sal sódica, Propilenglicol, EDTA Tetrasódico.

ENVASADO
Frasco de cristal con pulverizador de cánula – Espray 30 ml.

MODO DE ACCIÓN
La mucositis oral inducida por la radioterapia o la quimioterapia es un efecto colateral frecuente en pacientes afectados de cáncer.

El daño de la mucosa se desarrolla a través de una fase de iniciación seguida de una fase de ampliación del daño: el resultado es una fase de ulceración seguida, en tiempos variables, por una fase de reparación del tejido. La mucosidad oral se caracteriza por eritemas y úlceras recurrentes de la mucosa con dolor urente de diversa gravedad. Formas de mucositis graves tienen un fuerte impacto sobre la calidad de vida y pueden poner en peligro la capacidad de tolerar el plan terapéutico programado. Mucosamin® espray, creando un estrato protector, actúa sobre la fase ulcerosa de la mucositis y favorece una más rápida reducción del dolor y del ardor.

El ácido hialurónico y los aminoácidos entran después en acción en la fase regenerativa de la mucositis y favorecen la reparación de la mucosa oral.

INDICACIONES DE USO
Después de haber lavado la boca como se describe en la zona das lesões. Dirigir a ponta do aplicador para o lado uniforme por toda la cavidad oral y en la zona de la lesión. Dirigir la punta del aplicador hacia las zonas de ulceración o, en cualquier caso, urentes y rociar varias veces hasta

USO PREVISTO
Mucosamin® spray es un producto sanitario de acción principalmente protectora de las mucosas orales, realizado de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE MDD. El producto contiene ácido hialurónico, componente principal del tejido conjuntivo, y aminoácidos destinados a favorecer la formación del colágeno.

PRECAUCIONES DE USO
Antes del tratamiento, retirar de la zona ulcerada el material extraño que pudiera haber mediante enjuagues y lavado delicado con gasa. Después de haber limpiado la zona a tratar, rociar el producto. No suspender las posibles terapias anti-micóticas prescritas. El producto no tiende a obstruir el pulverizador, pero sin embargo es una buena medida alejar residuos de producto de la aplicación mediante lavado con gasa húmeda después de cada uso.

CONTRAINDICACIONES
Contraindicado en caso de comprobada hipersensibilidad a los componentes.

No se conocen fenómenos de sobredosis.

No se conocen efectos colaterales.

No se conocen interacciones con fármacos y sustancias medicamentosas.

Si bien no se conocen efectos secundarios en caso de embarazo y lactancia, el médico debe decidir si resulta oportuno prescribir la aplicación.

Mucosamin® spray es un producto caracterizado por una buena tolerabilidad.

COMPOSICIÓN
Agua depurada, hialuronato de sodio, Glicina, L-Prolina, L-Leucina, L-lisina clorhidrato, Metil 4 - hidroxibenzoato sal sódica, Propil 4 - hidroxibenzoato sal sódica, Propilenglicol, EDTA Tetrasódico.

ENVASADO
Frasco de cristal con pulverizador de cánula – Espray 30 ml.

MODO DE ACCIÓN
La mucositis oral inducida por la radioterapia o la quimioterapia es un efecto colateral frecuente en pacientes afectados de cáncer.

El daño de la mucosa se desarrolla a través de una fase de iniciación seguida de una fase de ampliación del daño: el resultado es una fase de ulceración seguida, en tiempos variables, por una fase de reparación del tejido. La mucosidad oral se caracteriza por eritemas y úlceras recurrentes de la mucosa con dolor urente de diversa gravedad. Formas de mucositis graves tienen un fuerte impacto sobre la calidad de vida y pueden poner en peligro la capacidad de tolerar el plan terapéutico programado. Mucosamin® espray, creando un estrato protector, actúa sobre la fase ulcerosa de la mucositis y favorece una más rápida reducción del dolor y del ardor.

El ácido hialurónico y los aminoácidos entran después en acción en la fase regenerativa de la mucositis y favorecen la reparación de la mucosa oral.

INDICACIONES DE USO
Después de haber lavado la boca como se describe en la zona das lesões. Dirigir a ponta do aplicador para o lado uniforme por toda la cavidad oral y en la zona de la lesión. Dirigir la punta del aplicador hacia las zonas de ulceración o, en cualquier caso, urentes y rociar varias veces hasta

USO PREVISTO
Mucosamin® spray es un producto sanitario de acción principalmente protectora de las mucosas orales, realizado de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE MDD. El producto contiene ácido hialurónico, componente principal del tejido conjuntivo, y aminoácidos destinados a favorecer la formación del colágeno.

PRECAUCIONES DE USO
Antes del tratamiento, retirar de la zona ulcerada el material extraño que pudiera haber mediante enjuagues y lavado delicado con gasa. Después de haber limpiado la zona a tratar, rociar el producto. No suspender las posibles terapias anti-micóticas prescritas. El producto no tiende a obstruir el pulverizador, pero sin embargo es una buena medida alejar residuos de producto de la aplicación mediante lavado con gasa húmeda después de cada uso.

CONTRAINDICACIONES
Contraindicado en caso de comprobada hipersensibilidad a los componentes.

No se conocen fenómenos de sobredosis.

No se conocen efectos colaterales.

No se conocen interacciones con fármacos y sustancias medicamentosas.

Si bien no se conocen efectos secundarios en caso de embarazo y lactancia, el médico debe decidir si resulta oportuno prescribir la aplicación.

Mucosamin® spray es un producto caracterizado por una buena tolerabilidad.

COMPOSICIÓN
Agua depurada, hialuronato de sodio, Glicina, L-Prolina, L-Leucina, L-lisina clorhidrato, Metil 4 - hidroxibenzoato sal sódica, Propil 4 - hidroxibenzoato sal sódica, Propilenglicol, EDTA Tetrasódico.

ENVASADO
Frasco de cristal con pulverizador de cánula – Espray 30 ml.

MODO DE ACCIÓN
La mucositis oral inducida por la radioterapia o la quimioterapia es un efecto colateral frecuente en pacientes afectados de cáncer.

El daño de la mucosa se desarrolla a través de una fase de iniciación seguida de una fase de ampliación del daño: el resultado es una fase de ulceración seguida, en tiempos variables, por una fase de reparación del tejido. La mucosidad oral se caracteriza por eritemas y úlceras recurrentes de la mucosa con dolor urente de diversa gravedad. Formas de mucositis graves tienen un fuerte impacto sobre la calidad de vida y pueden poner en peligro la capacidad de tolerar el plan terapéutico programado. Mucosamin® espray, creando un estrato protector, actúa sobre la fase ulcerosa de la mucositis y favorece una más rápida reducción del dolor y del ardor.

El ácido hialurónico y los aminoácidos entran después en acción en la fase regenerativa de la mucositis y favorecen la reparación de la mucosa oral.

INDICACIONES DE USO
Después de haber lavado la boca como se describe en la zona das lesões. Dirigir a ponta do aplicador para o lado uniforme por toda la cavidad oral y en la zona de la lesión. Dirigir la punta del aplicador hacia las zonas de ulceración o, en cualquier caso, urentes y rociar varias veces hasta

USO PREVISTO
Mucosamin® spray es un producto sanitario de acción principalmente protectora de las mucosas orales, realizado de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE MDD. El producto contiene ácido hialurónico, componente principal del tejido conjuntivo, y aminoácidos destinados a favorecer la formación del colágeno.

PRECAUCIONES DE USO
Antes del tratamiento, retirar de la zona ulcerada el material extraño que pudiera haber mediante enjuagues y lavado delicado con gasa. Después de haber limpiado la zona a tratar, rociar el producto. No suspender las posibles terapias anti-micóticas prescritas. El producto no tiende a obstruir el pulverizador, pero sin embargo es una buena medida alejar residuos de producto de la aplicación mediante lavado con gasa húmeda después de cada uso.

CONTRAINDICACIONES
Contraindicado en caso de comprobada hipersensibilidad a los componentes.

No se conocen fenómenos de sobredosis.

